

ピップ内服液

第3類医薬品 50mL

【効能・効果】●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₁の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時**【用法・用量】**大人(15才以上)1日2回、1回1本(50mL)を服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。○定められた用法・用量を守ること。○小児には服用させないこと。**【保管及び取扱い上の注意】**(1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)。(4)開封後はただちに服用すること。(5)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

【使用上の注意】

【相談すること】1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

【成分・分量】本品1日量<100mL(50mL×2)>中
オキソアミチン末…200mg、ビタミンB₁硝酸塩…20mg、
ビタミンB₂リン酸エステル…15mg、
ビタミンB₆…50mg、ニコチン酸アミド…60mg、
ビタミンB₁₂…60μg、
添加物:転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、パラベン、エタノール、香料、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、プロピレングリコール○本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

発売元



ピップトウキョウ株式会社

東京都千代田区内神田3-3-7F1048528
お客様相談室 ☎(03)3252-6546
(土・日・祝日を除く10:00~17:00)



ピップフジモト株式会社

大阪市中央区豊人橋2-1-36 F540-0011
お客様相談室 ☎(06)6945-4427
(土・日・祝日を除く10:00~17:00)

製造販売元

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214-1 7839-2121

副作用被害救済制度

☎0120-149-931