

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

かゆみ・しっしん治療薬

新サニアゾルD[®]

〔特 徴〕

湿疹、かぶれ等の皮膚疾患は治りにくく、はげしいかゆみや炎症を伴います。新サニアゾルDは、ゾルタイプの外用剤で、すぐれた消炎、鎮痒効果と共に、伸びがよく、速乾性で使用感のよいのが特徴です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

湿疹、ただれ、かぶれ、じんましん、皮膚炎、かゆみ、あせも、やけど

〔用法・用量〕

1日数回適量を患部に塗布する。

(必ず裏面もお読みください)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)定められた用法を守ってください。

〔成分〕

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン 酢酸エステル	0.025%	かゆみをとめ、炎症を鎮める副腎皮質ホルモン剤です。
アラントイン	0.2%	組織形成を促進します。
アミノ安息香酸 エチル	0.5%	患部の痛みやかゆみを和らげます。

添加物として、クロタミトン、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物及びpH調節剤を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎0120-149-931



発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20



サニアはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。