

第2類医薬品

日本薬局方

# クレゾール石ケン液

Saponated Cresol Solution

殺菌消毒剤

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。



## 使用上の注意

### してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる]

1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。
2. 次の部位には使用しないこと。
  - 1) 目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗し、直ちに眼科医の診療を受けること。
  - 2) 広い範囲の皮膚または深い傷に使用しないこと。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - 1) 医師の治療を受けている人。
  - 2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
  - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 4) 患部が広範囲の人。
  - 5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
  - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
  - 2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

## 効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒  
便所、便器、ごみ箱、たんつぼ、浄化そう等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

## 用法・用量

次のように水で希釈して洗浄する。

1. 手指の消毒の場合 : 2% (本剤の50倍液)
2. 創傷面の殺菌の場合 : 1% (本剤の100倍液)
3. 便所等の消毒の場合 : 3% (本剤の33倍液)

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
3. 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
4. 本品は使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所に十分注意すること。また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。
5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

(希釈方法)

- 33倍液 : 本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。  
50倍液 : 本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。  
100倍液 : 本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

## 成分・分量

本品は、クレゾール4.2～5.2vol %を含む。

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
2. 小児の手が届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
4. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。(原液を取扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用すること。)

【包装】 100mL、500mL



発売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元  
大成薬品工業株式会社  
福岡県筑後市大字熊野字屋敷 998-1

100mL C09-MS  
500mL C09-MS

大洋製薬お客様相談窓口  
☎0120-184328  
受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝日除く)

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931