

第3類医薬品

新ホルム散

SHIN HORUMU POWDER

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

きりきず、すりきず、ただれ、靴ずれ

用法・用量

患部を清浄にし、1日2～3回適量を散布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた、用法・用量を守ること
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科専門医の診断を受けること
- 外用にのみ使用し、内服しないこと

成分・分量

本品100g中

日局 アクリノール水和物・・・0.2g

日局 酸化亜鉛・・・・・・・・・・13.0g

添加物：日局 沈降炭酸カルシウム、日局 タルク

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと

■上手な使い方■

- ①ご使用前に、傷口の汚れを水道水等できれいに洗って清浄にしてください。
- ②傷口の上で、容器の中心を押して粉末を散布してください。
- ③散布された傷口は救急絆創膏等で軽くおさえてください。

ご注意（化膿の原因となりますので以下を守ってご使用ください。）

*ご使用前に、傷口の土や泥等の汚れをきれいに洗い落として清浄にしてください。

【包装】 20g



製造販売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

20g

G08-TS

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)