

第2類医薬品

小学生・中学生に

宇津ジュニアかぜ薬A

宇津ジュニアかぜ薬Aは、小学生・中学生のための総合感冒剤です。すぐれた6種類の成分にキキョウとカンゾウを配合し、かぜの諸症状の緩和に効果的です。小学校低学年のお子さまにも飲みやすい小さな糖衣錠です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬に定められた注意事項として成人が服用される際のこと記載しております。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気が現れることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しき等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等が現れる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜に現れる。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等が現れる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等が現れる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状が現れることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

[成分・分量] 1日量(12錠)中

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、頭・のど・関節などの痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.33mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしずめます。
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	32mg	せきの中枢に働いてせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支に働いてせきをしずめ、痰の排泄を助けます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	100mg	気道の分泌を促進し、痰の粘度を下げ痰を出しやすくします。
無水カフェイン	100mg	頭痛をやわらげ、眠気を防ぎます。
カンゾウ粗エキス (原生薬換算量533mg)	106.6mg	のどのはれをしずめて痛みをやわらげ、痰をうすめて排泄しやすくします。
キキョウエキス (原生薬換算量533mg)	53.3mg	

添加物として、炭酸Ca、セルロース、白糖、タルク、ヒプロメロース、アラビアゴム、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、酸化チタン、ゼラチン、マクロゴール、ショ糖脂肪酸エステルを含有しています。

[効 能] かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

[用法・用量] 次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
5才以上 7才未満	2錠	3回
7才以上 11才未満	3錠	
11才以上 15才未満	4錠	
5才未満	服用させないこと	

(1) 定められた用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ先 宇津救命丸株式会社 お客様相談室

TEL03(3295)2681(平日9:00~17:00)

発売元 宇津救命丸株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-3 TEL03(3291)2661(代表)

製造販売元 東亜薬品株式会社 〒939-3542 富山県富山市水橋開院277番10