

胃腸鎮痛鎮痙薬

ムカムカ・はきけ・胃痛に

サクロン[®]Q

第2類医薬品

サクロンQは、胃酸やアルコールなどが胃粘膜を刺激して起きる「ムカムカ・はきけ・胃痛」に速く効く胃ぐすりです。成分(オキセサゼイン)が胃粘膜に直接作用し、つらい症状を改善します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】

- ① 次の人は服用しないでください。
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(2) 15歳未満の小児
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の胃腸薬(ロートエキスを含有する製剤)、他の胃腸鎮痛鎮痙薬
- ③ 長期連用しないでください。



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 高齢者
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛、ねむけ、めまい、脱力感
- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘
- ④ 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

胃痛、腹痛、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、さしこみ(疝痛、癩)、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ(おくび)

用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	2錠 	1日3回まで
小児(15歳未満)	 服用しないこと	


服用間隔は4時間以上おいてください。

[用法・用量に関連する注意]

かまずにすぐのみこんでください。(早くとける錠剤ですので、成分が口の中に広がると口内にしびれが残ります。)

[錠剤の取り出し方]

右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



ひとくちメモ

Q. サクロンQは、いつ飲んだらよいのでしょうか？

A. 胃の痛みやはきけを感じた時いつでもお飲みいただけます。ただし、服用を続ける場合は、4時間以上間隔をおいてください。

成分と働き

成人1回量2錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
オキセサゼイン	5mg	胃粘膜に直接作用して胃痛、はきけなどの刺激をブロックします。

[添加物]

トウモロコシデンプン、D-マンニトール、ステアリン酸Ca、セルロース

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

●お買い求めのお店

●エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454

受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



サクロンQの製品内容は
ホームページでも紹介しています。

i-no-science.com

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU14316-8IX