

太田胃散〈内服液〉

胃腸薬

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 開栓されている製品は服用しないでください。開栓後は保存しないでください。

使用期限

製造番号

太田胃散 〈内服液〉

11種の
有効成分

飲みすぎ
二日酔いのむかつき
はきけに

スッキリ飲みやすい味

第2類医薬品

 太田胃散

効能・効果

飲みすぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、悪心)、胃もたれ、食欲不振、胃弱、消化不良、食べすぎ、胸やけ、嘔吐、胃部・腹部膨満感、胸つかえ

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回、1本を食前、食後又は就寝前に服用してください。15歳未満は服用しないでください。※生薬成分を含むため、沈殿を生じることがありますが、品質に影響はありません。よく振ってから服用してください。

成分 1日量(50mL)中

コウボク流エキス0.45mL(コウボクとして450mg)、ソウジュツ流エキス0.6mL(ソウジュツとして600mg)、ゲンチアナ流エキス0.2mL(ゲンチアナとして200mg)、ケイヒ流エキス0.3mL(ケイヒとして300mg)、ウイキョウ流エキス0.15mL(ウイキョウとして150mg)、チョウジエキス606mg(チョウジとして200mg)、チンピエキス60mg(チンピとして300mg)、ショウキョウ流エキス0.3mL(ショウキョウとして300mg)、モッコウエキス100mg(モッコウとして200mg)、カンゾウ抽出物35mg(カンゾウとして500mg)、カルニチン塩化物160mg
〔添加物〕l-メントール、安息香酸Na、パラベン、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調整剤、香料、白糖、ハチミツ

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」

☎(03) 3944-1311(代表)

受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931

【発売元】



株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2

<http://www.ohta-isan.co.jp/>

【製造販売元】

日新薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1