

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬配合・粉末のかぜ薬

第②類医薬品

改源 カイゲン

特徴

- 「改源」は非ピリン系のかぜ薬です。
- 抗ヒスタミン剤が入っていませんから、ねむけを起こすことの少ないかぜ薬です。
- かぜの回復を助ける生薬成分のカンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末を配合していますので、独特の風味があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用時は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱
(8)次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、高血圧、甲状腺機能障害、糖尿病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症状 |
|-------|------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。) |
| ぜんそく | |

- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合。

効 能

かぜの諸症状（のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に茶湯又は湯水で服用してください。

| 年 齢 | 15才以上 | 11才以上 ～15才未満 | 7才以上 ～11才未満 | 3才以上 ～7才未満 | 1才以上 ～3才未満 |
|-----|-------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1回量 | 1包 | 2/3包 | 1/2包 | 1/3包 | 1/4包 |


<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4)1才未満には服用させないでください。

*服用の際は、粉薬をこぼさないようにご注意ください。



包み紙を広げます。



四角又は三角になるように折り目をつけ、粉薬を中央に寄せます。



茶湯又は湯水を口に含み、服用してください。

成分と作用

3包(2,100mg)中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | 含 量 | 作 用 |
|-----------------|----------|---|
| アセトアミノフェン | 900mg | 熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。 |
| dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩 | 30mg | せきをしずめ、のどを楽にします。 |
| 無水カフェイン | 75mg | 頭痛をやわらげます。 |
| カンゾウ末 | 200mg | せきをしずめ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助けます。 |
| ケイヒ末 | 200mg | 頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助けます。 |
| ショウキョウ末 | 100mg | せきをしずめ、かぜの回復を助けます。 |
| アマチャ末 | 120mg | 添加物として左記を含有します。 また、改源は味と香りの点に留意しており、茶湯でのむとき特にのみやすくなるよう、これらの賦形薬を配合しております。 |
| ℓ-メントール | 5.0mg | |
| d-ボルネオール | 9.0mg | |
| チヨウジ油 | 0.6mg | |
| バニリン | 0.52mg | |
| 香料 | 微量 | |
| 無水リン酸水素カルシウム | 459.88mg | |

<かぜを早く治すために>

- 暖かくしてよく眠り、身体を十分に休めましょう。
- 消化が良く栄養のある食事と水分の補給に心がけましょう。
- 入浴を控えて、酒・タバコは止めましょう。
- 部屋が乾燥しないよう気をくばりましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)1包を分割し服用した残りは、包み紙をもとどおりに折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
大入包装(60包)に添付している袋は携帯用としてお使いください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン「お客様相談室」 電話 06-6202-8911

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元 **株式会社カイゲン**
大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元 **堺化学工業株式会社**
大阪府河内長野市松ヶ丘中町1330-1