

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

下痢・食あたり・水あたり
止しゃ薬(下痢止め)
マツ®

新ワカ末プラスA錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
 - 高齢者
- 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回食後服用する。



下痢



はき下し

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分


成人1日分6錠(1錠298mg)中、次の成分を含んでいます。

成分	1日分 6錠中	作用
ベルベリン塩化物水和物 [Ⓔ]	300mg	下痢止(抗菌、腸内腐敗発酵による有害物質の産生抑制、腸管運動抑制、胆汁分泌促進作用)
チアミン硝酸物 [Ⓔ] (ビタミンB ₁)	25mg	ビタミンB ₁ の補給
サンザシ末	400mg	消化促進による下痢止

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、還元麦芽糖水アメ、セルロース、二酸化ケイ素、ポビドン、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、アセスルファムK、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開栓後は不要となりますので捨ててください。
- 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



(裏面につづきます)

新ワカ末プラスA錠

Before use, read this instruction sheet.
Keep this sheet carefully for future reference.

For diarrhea, food poisoning and water poisoning
Antidiarrheals

SHIN-WAKAMATU PLUS -A TABLETS

Precautions for Use

Consult your physician or pharmacist.

1. In any of the following cases, consult your physician, pharmacist, or registered retail person before taking the medicine.

- (1) You are receiving medical treatment by a physician.
- (2) You have diarrhea with fever, bloody stool or mucous stool.
- (3) You are of advanced age.

2. If your condition does not improve even after taking the medicine for several days, stop the medication immediately and seek advice from your physician, pharmacist, or registered retail person, taking this sheet with you.

Indications

Diarrhea, diarrhea due to indigestion, food poisoning, vomiting and purging, water poisoning, loose bowels and soft stool.

Dosage and Administration

Take the following dose three times per day after meals.

Age	Dose	Time of medication per day
Adults (over 15 years old)	2 tab.	3 times
Children aged 8 to 15 years old	1 tab.	3 times
Children under 8 years old	Should not take this medicine	

Notes on dosage and administration

Children must take the medicine under the guidance and supervision of a guardian.

Composition

6 tablets (298 mg per tablet) to be taken per day contains the following ingredients.

Ingredient	In 6 tablets taken per day	Effects
Berberine Chloride Hydrate	300mg	Binding the bowels (Antibacterial effects, prevention of generating harmful substances caused by putrefactive fermentation in the bowels, inhibition of movement of the intestinal tract and promotion of choler secretion)
Thiamine Nitrate (Vitamin B ₁)	25mg	Supply of Vitamin B ₁
Powdered Crataegus Fruit	400mg	Preventing diarrhea by improving digestion

The additives Hydroxypropylcellulose, Talc, Powdered Hydrogenated Maltose Starch Syrup, Microcrystalline Cellulose, Hydrated Silicon Dioxide, Povidone, Carmellose Calcium, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Oxide, Yellow Ferric Oxide, Acesulfame Potassium, Carnauba Wax are contained.

Precautions for storage and handling

- (1) Cap the bottle firmly and store it in a cool, dry place not exposed to direct sunlight.
- (2) Keep out of the reach of children.
- (3) Do not repack the medicine into another container. (It may cause misuse or deterioration of quality.)
- (4) The packing in the bottle is to prevent possible damage to tablets during transportation. Discard it after opening the bottle.
- (5) Do not consume the product after the expiry date.
- (6) In case the tablets absorb moisture of the air it would possibly cause them some discoloration or mottles. So make it in mind to keep the tablets out of any drop of water and not touch them with wet hand directly.

Distributed by

Kracie Pharmaceutical, Ltd.

20-20, Kaigan 3-Chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-8080, Japan.

Manufactured and
Distributed by

Kracie Pharma, Ltd.

20-20, Kaigan 3-Chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-8080, Japan.

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

TS02-U