

# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品 しもやけ・あかぎれ用薬

## ベルクリーン®S軟膏

### 特 徴

- 局所刺激作用のあるトウガラシチンキに、痛みやかゆみを止める成分を配合した軟膏で、あかぎれやしもやけなどに効果があります。

### ⚠️ 使用上の注意



#### 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2)湿潤やただれのひどい人
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある  
ので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

### 効 能

しもやけ、ひび、あかぎれ



しもやけ



あかぎれ

### 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布する。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に塗ってみて、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

## 成分

本品100g中、次の成分を含んでいます。

成分		100g中	主な作用
皮膚刺激剤	トウガラシチンキ (原生薬0.5gに相当)	5.0mL	皮ふを刺激することによって局所の血管を拡張し、血行を促進します。
末梢血管 拡張剤	トコフェロール酢酸 エステル	1.0g	手足の指先の末梢血管を拡張する作用がありますので、患部の血液循環をよくします。
局所鎮痛・ 鎮痒剤	dl-カンフル	2.5g	局所の血行の改善とともに鎮痛・鎮痒の作用を有します。
鎮痒剤	クロタミトン	5.0g	強力な鎮痒作用により、患部のかゆみを素早くやわらげます。
鎮痛剤	リドカイン	1.0g	痛みをおさえます。

添加物として、サラシミツロウ、マイクロクリスタリンワックス、ワセリンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- \* (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は使用しないでください。



## チューブ穴の開け方

キャップを逆さにして、キャップの突起部をチューブ先端部に強く押しつけて開口してください。



副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**クラシエ薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元 **クラシエ薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)