

■成分・分量(50mL中) / 合成ヒドロタルサイト600mg オキシアミヂン末45mg ニンジンエキス135mg(ニンジン904.5mg) ウコン末200mg ヒハツ末50mg ハッカ油8mg オウレン流エキス0.3mL(オウレン300mg) ゲンノショウコエキス100mg(ゲンノショウコ1000mg) カンゾウエキス86mg(カンゾウ602mg) [添加物]セルロース、カルメロースNa、ポビドン、パラベン、安息香酸Na、白糖、香料、エタノール ■使用上の注意 決してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。2. 長期連用しないでください 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 次の診断を受けた人。腎臓病 2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

胃腸薬

Kowa

液キャベコーフ

G



もたれ はきけ

■効能・効果/飲み過ぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃痛、消化不良、食欲不振、胃重、もたれ、胃酸過多、げっぷ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱

■用法・用量/成人(15歳以上)1日1回、1本を服用してください。●用法・用量を厳守してください。■保管及び取扱い上の注意/(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。●懸濁内服液なので服用の際、瓶をよく振ってください。

第2類医薬品 販売名 液キャベコーフG



発売元 興和株式会社  
 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
 製造 中外医薬生産株式会社  
 販売元 三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5-5  
 製品の問合せ先 興和(株) 03-3279-7755  
 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931