

2013年4月(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

かゆみに | ラナケイン^G冷感ジェル

販売名:ラナケイン G 鎮痒消炎薬 第2類医薬品

製品特徴

ラナケイン冷感ジェルは、ひんやりスーツとするかゆみ止めです
こんなかゆみにお使いください



1. 冷感成分(1-メントール)を4%配合し、ヒンヤリ感が続きます
2. 局所麻酔剤を2%配合し、塗ったそばからかゆみを抑えます
3. 抗ヒスタミン剤配合で、かゆみ、炎症をしっかり鎮めます
4. サラッとして塗りやすいジェルです
5. ステロイド成分は入っていません

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと：目の周囲、粘膜など

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
 - (4) 乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
- (5) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

成分・分量

100g中

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	(抗ヒスタミン剤)かゆみの発生を抑えます
リドカイン	2.0g	(局所麻酔剤)知覚神経を麻痺させ、かゆみを緩和します
1-メントール	4.0g	(冷感刺激剤)冷感刺激によって知覚神経を麻痺させ、かゆみを緩和します

添加物として、尿素、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、BHT、エタノール、リン酸を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ|<http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

引火性固体 危険等級Ⅲ エタノール含有物 MADE IN JAPAN