


使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器裏側に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

とろっとした
さしごこち
じんわり広がる
うるおい感



販売名:アイボン トローリ目薬 ドライアイ

目薬

第3類医薬品

コンタクトで目が乾いたり、装着による不快感やゴロゴロとした異物感を感じたり……普段しっかり涙が守っている目も、コンタクトレンズやパソコンの使いすぎなどで目が乾いてくると、このような様々な不快症状だけでなく、ドライアイ状態により角膜表面に傷や障害が起こる可能性もあります
コンタクトをしたまま目のお手入れをしたい方にぴったりなのが、涙液処方のアイボン トローリ目薬 ドライアイ。角膜保護成分配合のとろみのある薬液が、涙の不足で乾きがちな角膜表面にじんわり広がって、うるおい感たっぷりに目の乾きを癒します

特徴

- とろみのある薬液が乾きがちな角膜表面にじんわり広がり、目の乾きを緩和します
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムが、角膜をじっくり保護します
- 涙に近い成分なので、コンタクトをしたまま目のお手入れができます
 - ・すべてのコンタクトに使えます
 - ・コンタクトをしていない方もお使いいただけます

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人:はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人:緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い
3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間くらい使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズまたはソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴 点眼してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと
 - (3)点眼用にのみ使用すること
- 保存の状態によっては、容器の口周辺に白い結晶が付着することがあるので、その場合は清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用すること
 - 点眼後しばらく視野がぼやけることがあるので注意すること

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	500mg	角膜保護作用
塩化カリウム	50mg	涙液成分
塩化ナトリウム	300mg	涙液成分
ヒプロメロース	350mg	うるおい保持作用

添加物として、ホウ酸、エドト酸 Na、ソルビン酸K、pH調整剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないこと

●キャップの開閉方法

キャップ部分を上にして、容器の側面を持って開閉してください

容器の中心を押さえて開閉すると、薬液が飛び出すことがあります

① 開け方

キャップを
手前に
ひねる



② 閉め方

カチッと
音がするまで
押し下げる



製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
東亜薬品株式会社
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

10121747

MADE IN JAPAN

06