

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面およびボトル裏面に記載）を
過ぎた製品は使用しないこと



コンタクトレンズを
はずした後に

アイボンクール[®] c

Eyewash 洗眼薬

ほこりや汚れによる目の異物感、かゆみなどの不快な
原因を洗い流し、スッキリとさせます

販売名：アイボンクール c

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - 眼球乾燥症候群（ドライアイ[※]）の診断を受けた人
[※]医師から病名として診断を受ける程度の人を前提としています
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

目の洗浄、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼してください

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと
また再装着する場合は、洗眼してから10～15分程度あけること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄すること
- 混濁したものは使用しないこと
- 洗眼用にのみ使用すること

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
イブシロン-アミノカブロン酸	200mg	抗炎症作用
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	抗炎症作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	10mg	代謝促進作用
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行促進作用
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	40mg	角膜保護作用

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、エデト酸Na、プロピレン
グリコール、l-メントール、dl-カンフル、pH調整剤を含有する

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところにキャップをしっかりとめて
箱に入れて保管すること
- 小児の手の届かないところに保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと
（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 洗眼カップは他の人と共用しないこと

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品

使い方

- コンタクトレンズを装着されている場合は、使用
前に必ずコンタクトレンズをはずすこと
- 使用前に目のまわりの化粧や汚れはきれいに
ふきとること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄すること
- 保存状態によって容器の口周辺に白い結晶が
付着することがあるので、その場合は清潔な
ガーゼなどで軽くふきとること

●コンタクトレンズを使っていない人も使用できます



① 本剤を添付洗眼
カップの内側の線
（5 mL）まで入れ、



目にぴったりと押し
当ててください



② 次にカップを目に
押し当てたまま、液が
こぼれないように頭を
後ろへそらし、
上を向き、



数回まばたきをして
洗眼してください
●片方の目を洗った液で
反対側の目を洗わない
でください
●30秒以上洗眼しない
でください

製品のお問合せは、お買い求めのお店
またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）

☎0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

※防腐剤とはベンザルコニウム塩化物、パラベンなどの
ことを指します