



特徴

1. 腰、肩、ひざの痛み優れた効き目を発揮する塗り薬です
2. ラバー面積が4倍(当社比)手を汚さず、効き目成分を一度でたっぷり塗れます
3. 有効成分インドメタシンが皮ふからすばやく浸透し、関節の痛みを和らげます

(原寸大)

第2類医薬品

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

販売名：アンメルシン1%ヨココヨ

(External Anti-Inflammatory / Analgesic Containing Indometacin) 外用消炎鎮痛剤

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を
起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむしなど、または化膿している患部
3. 長期運用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師
または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って
医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は
使用を中止し、このパッケージを持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店
またはお客様相談室にお問い合わせください

発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

成分・分量 100mL中

インドメタシン 1000mg
L-メントール 3000mg
添加物として、グリチルレチン酸、ベンジルアル
コール、ラウロマクロゴール、炭酸プロピレン、
pH調整剤、BHT、ハアセチルしょ糖、エタノール
を含有する

効能・効果

関節痛、腰痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腱鞘炎(手・手
首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに
伴う肩の痛み

用法・用量

1日4回を限度として患部に適量塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 11歳未満の小児に使用させないこと
- (3) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま
湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受
けること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
 - 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いも
ので覆わないこと
 - 皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて使用
しないこと
 - 同じ部位に他の外用剤を併用しないこと

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいと
ころ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立
てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因に
なったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
 - キャップをしっかりとめないで液がもれるこ
とがある
 - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、
化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革
などに液がつくと損耗したり、シミになること
があるので注意すること
 - 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に
従って、すみやかに洗うこと

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931