

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第2類医薬品 かゆみ・虫さされに クールなジェル

アレルギール[®]ジェル

《アレルギールジェル》は、

- 透明・ジェルタイプで、ベタつかず、清涼感があるかゆみ止めです。
- 塗ったあと、ジェルのうすい被膜ができ、患部をコートします。
- 即効性がある塩酸リドカイン（局所麻酔剤）をはじめとして、クロタミトン（鎮痒剤）、クロルフェニラミンマレイン酸塩（抗ヒスタミン剤）が痒みを抑えます。また、皮膚にできた赤み（発疹、発赤）などに対してはプレドニゾロン酢酸エステルが効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないで下さい

- (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2) 目の周囲、粘膜（例えば、口唇等）

2. 長期連用しないで下さい



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、 にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

- かゆみ、虫さされ、じんましん、あせも
- かぶれ、しもやけ
- 湿疹、皮膚炎、ただれ



あせもに



虫さされに



かぶれ、しもやけに

■ 用法・用量

1日1～数回、患部に適量を塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
4. 外用にのみ使用して下さい。

■ 成 分

《アレルギールジェル》は、無色～微黄色透明で芳香を有するゼリー状の軟膏で、1g中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量 (1g中)	作 用
塩酸リドカイン	30 mg	局所麻酔作用により痛みを和らげ、かゆみを抑えます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10 mg	かゆみを抑えます
クロタミトン	50 mg	かゆみを抑えます
プレドニゾン酢酸エステル	1.25mg	かゆみ・炎症を抑えます
ベンゼトニウム塩化物	1 mg	殺菌作用をあらわします
サリチル酸グリコール	20 mg	炎症を抑えます
l-メントール	30 mg	清涼感を与え、かゆみを抑えます

添加物：カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、トリエタノールアミン、セラニオール、アルコール、1,3-ブチレングリコール

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい（本剤は揮発性です。）。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 火気に近づけないで下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03 (5205) 8331
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

05®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東興薬品工業株式会社
富山県中新川郡立山町辻20