

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鼻炎用点鼻薬

第2類医薬品 花粉などによるアレルギー性鼻炎の鼻みず・鼻づまりに

新ルル[®]点鼻薬

新ルル点鼻薬の特徴

スプレータイプの点鼻薬で、アレルギー性鼻炎による鼻みず・鼻づまりにも効果的です。鼻の通りをよくして不快感をやわらげます。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないで下さい。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭重

■ 使用法

年 齢	1回量	1日使用回数
成人（15歳以上）	1～2度ずつ両鼻腔内に噴霧して下さい。	3～4時間ごとに6回まで使用できます。
15 歳 未 満	使用しないで下さい。	

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 点鼻用にのみ使用して下さい。

《点鼻容器の使用方法》

1. 容器のフタ（オレンジ色）をとり、噴出口のある先端部を鼻孔内に軽く入れます（図参照）。ご使用の際、容器を横にすると霧状となりませんので、容器は必ず垂直にしてお使い下さい。
2. 容器の胴部を両面から急速に押しますと、薬液は鼻腔内に噴霧されます。
3. 容器を鼻孔から外に出してから指の力を抜きます。（鼻孔内に入れたまま、指の力を抜きますと鼻みず等が容器内に逆に吸い込まれて薬液が汚染されるおそれがあります）
4. 鼻孔からとり出した際、鼻みず等がついた時は、必ず清潔なガーゼ、布等でふき取って下さい。



■ 成分・分量

本剤は、1mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量
ナファゾリン塩酸塩	0.5mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5 mg
塩酸リドカイン（無水物として）	3 mg
ベンゼトニウム塩化物	0.2mg

添加物：等張化剤、パラベン、pH調節剤

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 品質保持のため、一度開封した後はなるべく早くご使用下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ルルについて詳しくは www.lulu.jp

05®登録商標

 製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>