



第一三共ヘルスケア

Daiichi-Sankyo

第2類医薬品

ひきはじめのかぜに

# カロナール<sup>®</sup>

体力中等度以上の方の

**感冒の初期**

**鼻かぜ**

**頭痛**

眠くなる成分を含まない



# カコナール

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症  
感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 【用法・用量】

次の量を食間に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)本剤は1回1本飲みきりです。(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいます。よく振ってから服用して下さい。

## 【成分・分量】 90mL(30mL×3本)中

葛根湯抽出液(下記生薬の水製抽出液)・・・90mL

日局カクコン・・・8g	日局マ オ ウ・・・4g
日局タイソウ・・・4g	日局ケ イ ヒ・・・3g
日局シャクヤク・・・3g	日局カンゾウ・・・2g
日局ショウキョウ・・・1g	

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

### 〈お問い合わせ先〉

第一三共ヘルスケア(株)

お客様相談室

電話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)