

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬

第2類医薬品

パテックス フェルビナスターV

特

徴

- フェルビナクを1枚あたり35mg配合した鎮痛消炎テープ剤です。
- フェルビナクは痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成をおさえ、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- トコフェロール酢酸エステルが末梢の血流を促進し、肩や腰の痛みを改善します。
- 伸縮性にすぐれているので、関節部などの可動部にも使用しやすく、肌にピッタリとフィットします。
- 基布の色がモカベージュ色なので、服の下でも目立ちません。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) しっしん、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 連続して2週間以上使用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

使用法

15歳以上	表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。
15歳未満	使用しないで下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

フェルビナク	5g	痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえ、痛みをやわらげます。
l-メントール	3g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
トコフェロール酢酸エステル	2.3g	末梢の血流を促進し、肩や腰の痛みを改善します。

添加物: ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ジブチルヒドロキシルエーテル、流動パラフィン、その他3成分
[1枚あたり(7cm×10cm)膏体量0.7g]

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

製造番号
使用期限

05 ®登録商標