

第2類医薬品

ひきはじめのかぜに

# カコナル<sup>®</sup>II ツー



はちみつ  
ジンジャー  
フレーバー

飲みやすい液体タイプ

体力中等度以上の方の  
感冒の初期・鼻かぜ・頭痛に

1日2回タイプ

第一三共ヘルスケア

ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

# カコナル<sup>®</sup>II ツー

眠くなる成分を含まない



感冒の  
初期

鼻かぜ



頭痛

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



Daiichi-Sankyo

販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元  
新生薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

## 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## [効能・効果]

体力中等度以上のものの次の諸症: 感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## [用法・用量]

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は1回1本飲みきりです。
- (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

[成分・分量] 90mL(45mL×2本)中  
葛根湯濃縮液……81mL  
(下記生薬の水製抽出液)

日局カッコン 8g	日局マ オ ウ 4g
日局タイソウ 4g	日局ケ イ ヒ 3g
日局シャクヤク 3g	日局カンゾウ 2g
日局ショウキョウ 1g	

添加物: 白糖、スクラロース、ステビアエキス、タウマチン、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、グリセリン

## [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室  
電 話 03(5205)8331  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>