

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# ハイシー<sup>®</sup>1000

## ビタミンC製剤

### 特 徴

第3類医薬品

- ビタミンC 2,000mgを2包(1日最大服用量)で補給できます。
- ビタミンCがメラニンの生成を抑え黒色メラニンの無色化を促進することで、しみ・そばかすをやわらげます。皮膚に関連するビタミンB<sub>2</sub>も配合しています。
- ビタミンCが肌や血管の維持にかかせないコラーゲンの生成を助け、鼻や歯ぐきからの出血を予防します。
- 疲れたときやかぜをひいたときなどのビタミンC補給に効果的です。
- サツと溶ける、甘ずっぱい黄色の細粒です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
次の診断を受けた人。  
フェニルケトン尿症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

### 効 能

1. 次の諸症状の緩和  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合の出血予防  
歯ぐきからの出血、鼻出血
3. 次の場合のビタミンCの補給  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」

## 用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1～2回
15歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>  
用法・用量を厳守すること。

## 成分 2包(4g、1日最大服用量)中

成分	含量
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム〕	1,000mg 1,124.79mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)	12mg

添加物：トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、白糖

<成分に関連する注意>

- (1)尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある)。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



## マメ知識

### ビタミンCについて

- 皮膚のメラニンに働いて、しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。
- 細胞と細胞をつなぎ、肌のしなやかさを保つのに役立つコラーゲンの生成に必要で、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」  
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト <http://takeda-kenko.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号