



*2011年11月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ハイシー[®]ホワイト2

ビタミンC製剤

特 徴

第3類医薬品

- しみ・そばかすを緩和する主成分
メラニンの生成を抑え黒色メラニンの無色化を促進するビタミンC
- しみ・そばかすの緩和を助ける4つの成分
 - ①肌の代謝（ターンオーバー）を助けるL-システイン
 - ②過酸化脂質の生成を抑えメラニンの排出を助けるビタミンE
 - ③肌細胞の生まれ変わりを助けるパントテン酸カルシウム
 - ④脂質の代謝を助けるビタミンB₂
- 1日2回、1回2錠（15歳以上）、のみやすく小さい白い錠剤です。
- シュガーレスです。



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、腹痛 |

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

下痢

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

- 1.次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 2.次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
- 3.次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」

（裏面へ続く）

用法・用量

次の量を、水またはお湯で、かまずに服用すること。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|--------|---------|--------|
| 15歳以上 | 2錠 | 2回 |
| 7歳～14歳 | 1錠 | |
| 7歳未満 | 服用しないこと | |



<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

成分 4錠(15歳以上の1日服用量)中

| 成分 | 含量 |
|------------------------------|-------|
| アスコルビン酸(ビタミンC) | 600mg |
| d- α -トコフェロールコハク酸エステル | 50mg |
| L-システイン | 160mg |
| パントテン酸カルシウム | 30mg |
| リボフラビン(ビタミンB ₂) | 12mg |

添加物：乳酸カルシウム水和物、還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、エリスリトール、酸化チタン、アラビアゴム、マクロゴール、タルク

<成分に関連する注意>

- (1)尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある)。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンによるものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。なお、本剤はとくに吸湿しやすい製剤なので、服用のつどピンのフタをしっかりとめること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)ピンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びピンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (6)箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入すること。
- (7)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号