

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

つらい鼻づまり、鼻みず[®]に早く効く

〈点鼻薬〉

コールドタイジン[®]点鼻液^a

第②類医薬品

コールドタイジン点鼻液^aは、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり、鼻みずなど不快な鼻炎症状を改善する鼻炎用点鼻薬です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 患部が化膿している人。
- (2) モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- (5) 高齢者。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 精神神経系 | 眠気、頭痛、めまい、ふるえ、不眠、脱力感 |
| 鼻 | はれ、刺激感、熱感、乾燥感、鼻みず |
| その他 | 血圧上昇、動悸、不整脈、口の渇き、味覚異常 |

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

| 年 齢 | 1回量 | 1日使用回数 |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 成人（15歳以上） | 1～2度ずつ鼻腔内に噴霧 します。 | 3時間以上の間隔を おいて、6回まで 使用できます。 |
| 7歳以上15歳未満 | | |
| 7歳未満 | 使用しないでください。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。
- (5) 目には使用しないでください。



〈スプレーの使い方〉

使用前に鼻をかんでください。



〈使用にあたっての注意〉

- 噴霧するとき容器を下向きで使用すると正しく噴霧されなかったり薬液が多量に出る場合がありますので、必ず上向きでご使用ください。
- 容器の先端部を針などで突くと、折れたとき大変危険ですので絶対におやめください。



【成分・分量】


コールタイジン点鼻液aは、無色澄明の液剤で、1mL中の成分、分量は次のとおりです。

| 成分 | 分量 |
|-------------|-------|
| 塩酸テトラヒドロソリン | 1.0mg |
| プレドニゾン | 0.2mg |

添加物として、果糖、ベンザルコニウム塩化物、エタノール、pH調整剤を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないでください。



【包装】

コールタイジン点鼻液a：15mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室：☎0120-834389

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

株式会社陽進堂

〒939-2723 富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売提携

武田薬品工業株式会社