

目の疲れ・かゆみ・充血に

GAN 眼涼<sup>®</sup> RYO

生薬由来成分配合

## 商品の特長

- テレビやパソコン、ワープロなど私たちは目の疲れやすい環境で生活しています。また、花粉やほこりによる目のアレルギー症状なども増加しています。眼涼(がんりょう)は、生薬の黄柏・黄連(ベルベリン含有)、甘草(グリチルリチン含有)に由来する成分を配合した目薬です。眼涼は、日常の目の疲れや目のかゆみなどの不快な症状をやわらげ、花粉等による目の炎症にも優れた効果を発揮します。



## ⚠ [使用上の注意]

## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
  - 次の診断を受けた人：緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 目のかすみが改善されない場合。
  - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

**【効能・効果】** 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

**【用法・用量】** 1日3～6回、1回2～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を、まぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあります。)また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。

**【成分・分量】**

有効成分	含量(10mL中)	はたらき
ベルベリン硫酸塩水和物 (黄柏・黄連に由来する成分)	1mg	目のかゆみ、疲れ、まぶたのただれなどの 症状を起こした目の各種組織の炎症・修復 に有効です。
グリチルリチン酸二カリウム (甘草に由来する成分)	10mg	
アラントイン	10mg	
塩酸テトラヒドロゾリン	5mg	交感神経への作用により、結膜などの末梢 血管を収縮させ、充血を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン剤の一つで、目のかゆみ、 流涙などの症状をやわらげます。
シアノコバラミン	0.4mg	赤色のビタミンB <sub>12</sub> で、目の調整機能を つかさどる毛様体組織に直接作用し、 その機能回復を早めます。

添加物として、L-メントール、クロロブタノール、パラベン、ホウ砂、ホウ酸を含有します。

**保管及び取り扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、  
できるだけ速やかに使用してください。
- (6) 液色は成分の色です。液剤が衣服などに付くと着色することがあるので、付かないように十分注意してください。

〈包装〉10mL

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481