

筋肉・関節のつらい痛み

エアースロンパスDX

 フェルビナク
3.0%配合

スプレー式鎮痛消炎剤

商品の特長

- 優れた抗炎症、鎮痛効果が認められている成分「フェルビナク」3.0%と血液の循環をよくする成分「ℓ-メントール」3.0%を配合した鎮痛消炎スプレー剤です。
- 関節痛・筋肉痛、打撲、ねんざなどの患部にスプレーする事で、冷却効果に加え有効成分「フェルビナク」が皮膚から吸収されて、つらい痛みをとり除きます。

⚠ [使用上の注意]

⊗ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) 化膿している患部。

🗣️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ


3. 1週間くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、ねんざ、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】 1日2~4回、適量を患部に噴霧又は塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 用法・用量を守ってください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 顔に向けて噴霧しないでください。
- (5) 大量・広範囲には使用しないでください。
- (6) 外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気、せき、鼻やのどへの刺激等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。
- (7) よく振って、必ずノズルを下に向けて使用してください(上向き、横向きに使用するとガスだけが出て、薬液が残り、最後まで使用できなくなったり、薬液が飛び散ったりすることがあります)。
- (8) 患部まで10cmの距離で噴霧してください。
- (9) 同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないでください(凍傷になるおそれがあります)。
- (10) 肩・首などに使用する場合は手にとって塗布してください。
- (11) ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。



【成分・分量】

成分	含量(原液100g中)
フェルピナク	3g
l-メントール	3g

添加物として、エタノール、トリエタノールアミン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DMEを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 本剤が衣類や家具、皮革製品、化粧品等に付着しないように注意してください。変質又は変色するおそれがあります。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 火花が出る所で使用しないでください。

〈包装〉 80mL、120mL

【廃棄の際のガス抜き等の注意事項と方法】**〈ガス抜きの注意事項〉**

- ・必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しのよい屋外で行ってください。
- ・ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。
- ・本品のキャップ以外は使用しないでください。
- ・噴射されるガスを直接吸い込まないよう注意してください。

〈ガス抜きの方法〉

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

①「PUSH」マークを押すとボタンと肩カバーが分別できます。

②押しボタンを引き抜きます。

③キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。

④キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。

⑤噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により破棄してください。



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)