

血清高コレステロール改善薬  
**血中の余分な脂質をとる**  
**コレストン<sup>®</sup>**

高コレステロールは、自覚症状がなく、自分では気づきにくい症状です。本商品の服用後は定期的に医療機関でコレステロール値の測定をすることをお勧めします。

#### 商品の特長

- 「コレストン」は、血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和する医薬品です。
  - 大豆由来成分の「大豆油不けん化物」が腸管からの余分なコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促します。
  - パンテチンは、肝臓におけるコレステロールの代謝を改善。LDL(悪玉)コレステロールの分解を促し、またHDL(善玉)コレステロールを増加させ、血液中の余分なコレステロールをとり、血管壁への沈着を抑えます。
  - 天然型ビタミンE(酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール)は過酸化脂質の生成を抑え、血流をスムーズにし、末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和します。
- 「コレストン」はこれら3つの有効成分の力により効果を発揮します。

### ⚠️ [使用上の注意]



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。  
 医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合。
 

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ
  - 1ヶ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合。  
 (1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること。)
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。  
 出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。  
 下痢、軟便

**【効能・効果】** 血清高コレステロールの改善、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

**【用法・用量】** 次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

【成分・分量】 成人1日量(6カプセル)中に次の成分を含んでいます。

成分	分量	はたらき
パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます。
大豆油不けん化物 (ソイステロール)	600mg	大豆由来の成分で、腸管からのコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促進します。
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善します。

添加物としてサフラワー油、ポリソルベート80、カプセルにグリセリン、酸化チタン、サンセットイエローFCF、ゼラチン、D-ソルビトールを含んでいます。

#### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。また、服用のつどピンのフタをしっかりとめてください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **東海カプセル株式会社**

〒419-0202 静岡県富士市久沢168番地