

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

目のかゆみ・結膜充血に

ロートアルガード®

容量10mL

ハード・O₂
レンズ装着中にも
使用できます。

第2類医薬品

かゆみがつらい目に

防腐剤無添加

使用上の注意 ⚠

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販

売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合



効能・効果

- 目のかゆみ
- 結膜充血
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)

- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 目の疲れ
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

● 用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚

染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる) また、混濁したものは使用しないでください。



- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみご使用ください。

容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

有効成分

グリチルリチン酸二カリウム
配合量 0.25%

アレルギーの原因物質の放出を抑制し、炎症を鎮めます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩
配合量 0.03%

ヒスタミン(アレルギー原因物質)をブロックし、かゆみを抑えます。

塩酸テトラヒドロゾリン
配合量 0.01%

血管を収縮させ、充血を除去します。

ビタミンB₆
配合量 0.1%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促進します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、*l*-メントール、*d*-カンフル、*d*-ボルネオール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。
※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。



(2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。

(3) 小児の手の届かない所に保管してください。



(4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(5) 他の人と共用しないでください。

(6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

(8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

*目がかゆい時はまぶたをこすったり、刺激をくわえないようご注意ください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)