

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

胃腸薬 第2類医薬品

パンシロン®G

パンシロン®Gは、制酸、消化、健胃を目的とした胃腸薬で、
次のような特長があり、各症状に対しすぐれた効き目があります。

—— パンシロン®Gは、こんな症状の方に効きます。 ——



- 3種類の速効性制酸剤と1つの持続性制酸剤の配合により、胃内の酸度を早く、長く一定に整え胃の不快感を除きます。また、ロートエキスが胃酸分泌を抑制し胸やけなどを改善します。
- 2種類の消化酵素が消化を助け、胃腸の負担を軽くします。
- 4種類の健胃生薬の配合により、弱った胃の働きを改善します。
- 胃粘膜修復剤L-グルタミンが、胃の粘膜の再生を促進し、胃粘膜の修復を助けます。
- サッと溶けて、飲みやすい細粒状です。

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないでください。

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

口のかわき

4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効 能

胸やけ、胃痛、胃酸過多、げっぷ(おくび)、のみすぎ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃部不快感、食べすぎ、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胃もたれ、胃重、胸つかえ、胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を食後、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

●有効成分と作用 (3包中)

	有効成分	配合量	作 用
粘膜修復剤	L-グルタミン	405mg	胃壁のただれや炎症に対して、胃の粘膜を修復し正常に戻す働きをします。
健胃生薬	桂皮(ケイヒ)	150mg	胃のためにより生薬で、特有の芳香性や苦みを持つ健胃生薬です。消化液の分泌を促して、食欲の増進をはかると共に胃腸の動きをよくします。
	桂皮油(ケイヒ油)	6mg	
	縮砂(シュクシャ)	90mg	
	当薬(センブリ)	3mg	
制酸剤	炭酸水素ナトリウム	1950mg	胸やけなどに見られる過酸症状の緩和にすぐれた効き目のある速効性の制酸剤で、胃の中の酸度を早く一定に整え、消化剤の働きやすい状態を作ります。
	重質炭酸マグネシウム	600mg	
	沈降炭酸カルシウム	300mg	
	サナルミン	399mg	制酸効果を長く保つ持続性制酸剤で胃の中の酸度を長く一定に整え、胃壁を保護します。
	ロートエキス	30mg	胃液分泌抑制作用があり、制酸剤と組み合わせると胃酸中和効果が持続します。
消化剤	ジアスメンSS	240mg	ジアスメンSSは炭水化物(ご飯、パン、めん類など)、プロザイムはタンパク質(肉・魚など)の消化を助け胃の負担を軽くします。
	プロザイム	51mg	

添加物 : 2-メントール、セルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg

保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400024109