


【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

ハイチオールC プルミエール

第3類医薬品

L-システイン製剤

- ハイチオールCプルミエールは、L-システインを240mg(成人1日量)配合し、1日2回の服用で気になるシミ・そばかすに効果を発揮します。
L-システインがビタミンCとともに、内側からシミのもと(過剰にできるメラニン)の生成をおさえ、シミを治療します。



⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹 |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、腹痛 |



- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- ③ しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

用法・用量

次の1回量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。

| 年齢 | 成人(15才以上) | 7才~14才 | 7才未満 |
|-----|--|---|----------|
| 1回量 |  2錠 |  1錠 | ✗服用しないこと |

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分 4錠(成人1日量)中

L-システイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300mg
パントテン酸カルシウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24mg

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

○本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に容器のフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5)容器の中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



ハイチオールCプルミエール 成人30日分 120錠入りもございます。

| | |
|----------------|--|
| お問い合わせ先 | お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く） |
|----------------|--|

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>