

つらい疲れに

**ゼナ F0 first**  
first  
F0  
first

販売名：ゼナフ  
指定医薬部外品

**【使用上の注意】**

**相談すること**

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。  
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感  
(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
下痢

**【効 能】**

★滋養強壮 ★虚弱体質  
★肉体疲労・発熱性消耗性疾患・食欲不振・病中病後・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。  
※15才未満は服用しないでください。

**【注意】**

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

**【成 分】** 50mL 中

ニンジン（人参）エキスM ……………90mg （人参 600mg に相当）	ショウキョウ（生姜）流エキス…………… 0.3mL （生姜 300mg に相当）
ムイラブアマエキス-A ……………15mg （ムイラブアマ 300mg に相当）	ニクジュヨウ（肉蓯蓉）エキス……………75.8mg （肉蓯蓉 250mg に相当）
シャクヤク（芍薬）エキス……………30mg （芍薬 120mg に相当）	タウリン…………… 500mg
カンゾウ（甘草）エキス……………50mg （甘草 200mg に相当）	リボフラビンリン酸エステルナトリウム （ビタミン B <sub>2</sub> ）…………… 5mg
ケイヒ（桂皮）流エキス……………0.15mL （桂皮 150mg に相当）	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B <sub>6</sub> ）…………… 5mg
	ニコチン酸アミド……………20mg
	無水カフェイン……………50mg

添加物：白糖、pH調整剤、ポビドン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸 Na、パラベン、香料、アルコール（アルコール 0.17mL 以下）

**【注意】**

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室  
電話 03-3985-1800



**大正製薬株式会社**<sup>11</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp/zena/>