



のどのあれ・痛み、声がれに…

Medicated Drops

ヴィックス メディケイテッド ドロップ

ウメ

指定医薬部外品 使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

販売名：ヴィックス メディケイテッド ドロップ U

■使用上の注意 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。
皮ふ：発疹・発赤、かゆみ
- (2) 1週間使用しても症状がよくなる場合。

■効 能

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

■用法・用量

年齢に応じて次の量を1個ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 令	成人(15才以上)	5～14才	5才未満
1回量	3個	2個	使用しないこと
使用回数	1日4～6回		×

※使用するときは、1個ずつなめてください。1度に3個(15才以上)、もしくは2個(5～14才)を使用しないでください。

〔注 意〕

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

■成 分(18個中)

セチルピリジニウム塩化物水和物 8.28mg 添加物：クエン酸、*l*-メントール、香料、赤色102号、pH調整剤、シリコーン樹脂乳化液、カラメル、ブドウ糖液、白糖、タルク

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)吸湿しやすいので、開封後は袋の口を折り返して保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付 8:30～21:00
時間(土、日、祝日を除く)

Manufactured by: Reckitt Benckiser
Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.
Samut Prakarn, Thailand.

製造国：タイ