

扁桃腺炎・口内炎に 口腔咽喉塗布剤



大正ルゴール ピゴン

第3類医薬品 〈口腔咽喉薬〉

- ◆大正ルゴール ピゴンは、幼児にも使いやすい甘味のある液剤で、のど、口内の炎症に効果のある塗り薬です。
- ◆塗布により、のどに感染した病原菌を殺菌し、炎症を軽快させます。



使用上の注意

必ず読むこと!



⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 長期運用しないでください



相談すること



- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
 口内のひどいただれ
(6) 次の診断を受けた人。
 甲状腺機能障害
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- ③ 使用中又は使用後に気管、食道、胃腸、皮膚、目、その他体の各部位に刺激感等の異常を感じた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- ④ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

扁桃腺炎、口内炎




用法・用量

適量をとり患部に塗布してください。

〔使用例〕

清潔な綿棒の先に本剤を浸し、患部に軽くおしあてるように塗布してください。



〔注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)塗布用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)のどに塗る時、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意してください。
- (5)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (6)薬液や薬液をしみこませた綿等を誤って飲み込んだ時は、直ちに医師の診療を受けてください。
- (7)本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがありますので注意してください。

成 分

100g中

成 分	分 量	成 分	分 量
ヨウ素	0.5g	濃グリセリン	45.5g
ヨウ化カリウム	1.0g	ハッカ油	0.02g

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用中に薬液がこぼれ衣服等が着色したらすぐに水洗いしてください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田 3丁目24番 1号

<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元



健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)