

頭痛・歯痛・生理痛・神経痛に **第2類医薬品**

# ケロリン

(非ピリン系)

**ケロリン**はアセチルサリチル酸を主成分とし、頭痛・歯痛・生理痛・神経痛などの痛みや発熱に優れた効果を発揮する解熱鎮痛剤です。

- 《特徴》
- アセチルサリチル酸・無水カフェインが互いに働きあい、頭痛・歯痛・生理痛・発熱などをすみやかに和らげます。
  - のみやすい生薬(ケイヒ)配合の粉末剤で、早く溶けて優れた効果を発揮します。
  - 眠くなる成分は入っていません。コンパクトな分包サイズで学校・会社・車の運転・外出先での服用にも便利です。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 出産予定日12週以内の妊婦。
  - (4) 15才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用時は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害 ぜんそく	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

《効能・効果》 ●頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。  
●悪寒・発熱時の解熱。

《用法・用量》 次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上(大人)	1 包	2 回
15才未満	服用しないこと	

《用法・用量に関連する注意》

本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。

《成分・分量》 1包(800mg中)

アセチルサリチル酸..... 600mg

無水カフェイン..... 60mg

ケイヒ末..... 60mg

添加物としてバレイショデンプンを含む

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10

☎076(421)5531 受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元

**内外薬品株式会社**

富山県富山市三番町3-10